

Izbira vzorca

- I zberite s formalinom prepojen parafi nski blok (FFPE) z največjo količino invazivnega karcinoma, ki je morfološko skladen s predloženo diagnozo.
2. Sprejemljivi so vzorci FFPE, vključno z neobarvanimi vzorci stekelc.
 3. Za uspešno analizo vašega vzorca je priporočljiva uporaba nevtralnega pufirskega 10-% formalina. Upoštevajte smernice standardne prakse vašega laboratorija za obdelavo FFPE tkiva.
 - Genomski testi Agendia potrebujejo površino vsaj 9 mm² v enem odseku tkiva. Uspešno testiranje na vzorcih z manjšo površino je mogoče doseči, če predložite dodatna neobarvana stekelca ali bloke.
 5. Podjetje Agendia bo izvedlo barvanje s hematoksilinom in eozinom z uporabo predloženega materiala, ki se uporablja za oceno odstotka tumorskih celic. Za izvedbo testa je potrebnih vsaj 30 % invazivnega tumorja (z uporabo ocenjenega števila invazivnih tumorskih celic, deljenega s skupnim številom vseh celic z jedri).¹. Kadar je potrebno in izvedljivo, bo izvedena mikro-disekcija, da se izognemo velikim območjem duktalnega karcinoma in situa, nekroze, maščobnega tkiva, strome in/ali krvavitve, ker bodo ti celični elementi zmanjšali odstotek tumorskih celic.

1. MicroArray MP in BP IFU MKT-517 (M-ROW-387) in MKT-518 (M-ROW-388)

Navodila za pripravo vzorca

A) FFPE bloki

- Za vsak blok namestite 1 nalepko s črtno kodo vzorca, ki je priložena na zgornjem notranjem pokrovu kompleta za zbiranje vzorcev Agendia (glejte sliko 1).
2. Blok tumorja postavite v majhno plastično vrečko in vrečko zaprite.
 3. Vzorec pritrdite v priloženi vložek iz stiropora in ga položite v komplet. Če potrebujete pakete z gelom, se obrnite na našo ekipo za pomoč strankam.
 - Predloženemu testnemu vzorcu ni treba predložiti stekelca s hematoksilinom in eozinom, ker bo podjetje Agendia izvedlo barvanje s hematoksilinom in eozinom s predloženim materialom.
 5. Upoštevajte navodila za pošiljanje.



Slika 1



Slika 2

B) Neobarvana stekelca

- Pripravite deset (10) 5- μ m serijskih neobarvanih preparatov z enim 5- μ m serijskim delom na vsakem stekelcu.
- Uporabite napolnjena stekelca.
 - Prepričajte se, da so razdelki na vsakem stekelcu podobno obrnjeni.
 - Pustite, da se predmetna stekelca posušijo pri sobni temperaturi ali v sušilniku za predmetna stekelca oz. v pečici.
 - Ne polagajte pokrovnih stekelc na neobarvana stekelca.
2. Za vsako stekelce nalepite eno nalepko s črtno kodo vzorca, ki je priložena na zgornjem notranjem pokrovu kompleta za zbiranje vzorcev Agendia.
 3. Označite serijsko razdeljena neobarvana stekelca (1 do 10), da označite vrstni red, v katerem so izrezani.
 - Ko so neobarvana stekelca suha, jih vstavite v nosilce za stekelca in na zunanjo stran vsakega nosilca za stekelca namestite eno nalepko s črtno kodo vzorca (glejte sliko 2).
 5. Nosilce stekelc pritrdite v priloženi vložek iz stiropora in ga položite v komplet.
 - Nadaljujte z navodili za pošiljanje

Navodila za pošiljanje

1. Registrirajte vzorec tkiva primarnega tumorja. V primeru multifokalnega tumorja registrirajte drug vzorec tkiva istega bolnika posebej. Registrirajte se prek portala za naročanje (<https://agendia.com/order-a-test>) ali uporabite obrazec za zahtevo za testiranje (TRF).
2. Če uporabljate TRF, obdržite kopijo za lastno evidenco in vstavite izvirno kopijo v komplet. Če ste naročili prek spleta, vam TRF ni treba uporabiti. Kopija vašega naročila je na voljo v poglavju »view orders«.
3. Vse morebitne neuporabljene nalepke s črtno kodo vzorca pustite v kompletu za zbiranje vzorcev Agendia, ki se NE smejo uporabiti za drugega bolnika ali drugi primarni tumor.
4. Zaprite komplet vzorcev Agendia in ga vstavite v klinični paket ali letak.
5. Če uporabljate FedEx: Izpolnite 1. razdelek mednarodnega letalskega tovornega lista FedEx® in ga vložite FedEx Clinical Pak, vključno s 4 kopijami elektronskih trgovinskih dokumentov.
6. Če uporabljate DHL: Prilepite DHL-ov tovorni list na letak DHL in v vrečko priložite elektronske trgovske dokumente, če je primerno.
7. Če uporabljate MRW: Izpolnite podrobnosti o pošiljki s spletno oddajo ali pošljite e-pošto, da zahtevate prevzem pošiljke.
8. Paket Clinical Pak ali letak zaprite tako, da odstranite plastični ščitnik lepila z bele črte in prilepite.
9. Paket položite na določeno lokacijo za prevzem kurirske službe na vaši lokaciji.
10. Če vaša lokacija nima standardnega prevzema, se obrnite na ustrezno kurirsko službo ali službo za stranke Agendia.